Báze a dimenze vektorových prostorů

Buď $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ je konečná posloupnost vektorů z $\mathbf{V}$. Existují-li prvky $s_1, s_2, \ldots, s_n \in T$, z nichž alespoň jeden je různý od nuly 0, takové, že $s_1 \cdot \mathbf{u}_1 + s_2 \cdot \mathbf{u}_2 + \cdots + s_n \cdot \mathbf{u}_n = \mathbf{o}$, řekneme, že vektory $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ jsou **lineárně závislé**. Tedy konečná posloupnost vektorů z $\mathbf{V}$ je lineárně závislá, existuje-li lineární kombinace těchto vektorů s koeficienty z T, jež nejsou všechny nulové, taková, že výsledkem této lineární kombinace je nulový vektor.

Je-li $n = 1$, tedy máme-li co do činění s posloupností skládající se pouze z jediného vektoru $\mathbf{u}$ z $\mathbf{V}$, pak uvedená definice dává, že vektor $\mathbf{u}$ je lineárně závislý právě tehdy, když $\mathbf{u} = \mathbf{o}$. Pro $n > 1$ se hodí následující kritérium.

Tvrzení. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Posloupnost vektorů $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ z $\mathbf{V}$, kde $n > 1$, je lineárně závislá právě tekdy, když existuje index $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ takový, že vektor $\mathbf{u}_i$ je lineární kombinací vektorů $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_{i-1}$, $\mathbf{u}_{i+1}, \ldots, \mathbf{u}_n$.

Důkaz. Jsou-li vektory $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ lineárně závislé, existují prvky $s_1, s_2, \ldots, s_n \in T$, z nichž alespoň jeden je nenulový, takové, že $s_1 \cdot \mathbf{u}_1 + s_2 \cdot \mathbf{u}_2 + \cdots + s_n \cdot \mathbf{u}_n = \mathbf{o}$. Nechť $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ je takový index, že $s_i \neq 0$. Pak odtud plyne, že $\mathbf{u}_i = (-s_i^{-1} \cdot s_1) \cdot \mathbf{u}_1 + \cdots + (-s_i^{-1} \cdot s_{i-1}) \cdot \mathbf{u}_{i-1} + (-s_i^{-1} \cdot s_{i+1}) \cdot \mathbf{u}_{i+1} + \cdots + (-s_i^{-1} \cdot s_n) \cdot \mathbf{u}_n$.

Naopak je-li vektor $\mathbf{u}_i$ lineární kombinací vektorů $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_{i-1}$, $\mathbf{u}_{i+1}, \ldots, \mathbf{u}_n$, pak existují prvky $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n \in T$ takové, že $\mathbf{u}_i = t_1 \cdot \mathbf{u}_1 + \cdots + t_{i-1} \cdot \mathbf{u}_{i-1} + t_{i+1} \cdot \mathbf{u}_{i+1} + \cdots + t_n \cdot \mathbf{u}_n$. Odtud plyne, že $t_1 \cdot \mathbf{u}_1 + \cdots + t_{i-1} \cdot \mathbf{u}_{i-1} + (-1) \cdot \mathbf{u}_i + t_{i+1} \cdot \mathbf{u}_{i+1} + \cdots + t_n \cdot \mathbf{u}_n = \mathbf{o}$, přičemž koeficient u $\mathbf{u}_i$ je -1, čili je nenulový.

Poznamenejme, že obsahuje-li například posloupnost vektorů $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ z $\mathbf{V}$ nulový vektor $\mathbf{o}$ anebo obsahuje-li tato posloupnost dvakrát tentýž vektor, pak je lineárně závislá.

Buď $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ opět vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Není-li posloupnost vektorů $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ z $\mathbf{V}$ lineárně závislá, řekneme, že tato posloupnost je **lineárně nezávislá**. Jinak řečeno, vektory $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ jsou lineárně nezávislé, jestliže pro libovolná $s_1, s_2, \ldots, s_n \in T$ splňující $s_1 \cdot \mathbf{u}_1 + s_2 \cdot \mathbf{u}_2 + \cdots + s_n \cdot \mathbf{u}_n = \mathbf{o}$ platí, že $s_1 = s_2 = \cdots = s_n = 0$.

Poznamenejme, že je-li $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ lineárně nezávislá posloupnost vektorů z $\mathbf{V}$, pak každá podposloupnost vybraná z této posloupnosti je rovněž lineárně nezávislá.

Je-li $M \subseteq \mathbf{V}$ konečná podmnožina, $M = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, pak místo značení $\langle M \rangle$ pro podprostor generovaný množinou M, jenž byl předmětem studia v minulé kapitole, píšeme stručně jen $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n \rangle$. Platí následující **Steinitzova věta o výměně**.

Věta. Buď $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n$ jsou takové vektory z $\mathbf{V}$, že je splněno $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m \in \langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$ a vektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ jsou přitom lineárně nezávislé. Pak platí $m \leq n$ a při vhodném přečíslování vektorů $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n$ platí rovněž

$$\langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_{m+1}, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle.$$

Důkaz. Postupujeme indukcí vzhledem k m. Je-li $m = 1$, pak $\mathbf{v}_1 \in \langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$. Poněvadž $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{o}$, je tedy nutně $n \geq 1$, takže $m \leq n$. Dále podle posledního tvrzení z minulé kapitoly existují $s_1, \ldots, s_n \in T$ taková, že $\mathbf{v}_1 = s_1 \cdot \mathbf{w}_1 + \cdots + s_n \cdot \mathbf{w}_n$. Přitom alespoň jeden z prvků $s_1, \ldots, s_n$ je nenulový. Přečíslujme vektory $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n$, a tím i prvky $s_1, \ldots, s_n$ tak, aby bylo $s_1 \neq 0$. Pak odtud plyne, že $\mathbf{w}_1 = s_1^{-1} \cdot \mathbf{v}_1 - (s_1^{-1} \cdot s_2) \cdot \mathbf{w}_2 - \cdots - (s_1^{-1} \cdot s_n) \cdot \mathbf{w}_n$. Z těchto rovností dále plyne, že $\langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$, neboť generátory každého z těchto podprostorů jsou obsaženy ve druhém z těchto podprostorů. Platí tedy požadovaná rovnost.

Nechť dále $m > 1$ a předpokládejme, že tvrzení věty platí pro $m - 1$. Vektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{m-1}$ jsou lineárně nezávislé, takže podle

tohoto předpokladu $m-1 \leq n$ a při vhodném přečíslování vektorů $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n$ je $\langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{m-1}, \mathbf{w}_m, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$. Ale $\mathbf{v}_m \in \langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$, takže $\mathbf{v}_m \in \langle \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{m-1}, \mathbf{w}_m, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$. Podle posledního tvrzení z minulé kapitoly to znamená, že existují $t_1, \ldots, t_n \in T$ taková, že $\mathbf{v}_m = t_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \cdots + t_{m-1} \cdot \mathbf{v}_{m-1} + t_m \cdot \mathbf{w}_m + \cdots + t_n \cdot \mathbf{w}_n$. Z předchozího tvrzení přitom plyne, že alespoň jeden z prvků $t_m, \ldots, t_n$ je nemulový, neboť vektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ jsou lineárně nezávislé. To také nevyhnutelně znamená, že $m \leq n$. Přečíslujme vektory $\mathbf{w}_m, \ldots, \mathbf{w}_n$, a tím také prvky $t_m, \ldots, t_n$ tak, aby bylo $t_m \neq 0$. Pak z poslední rovnosti plyne, že $\mathbf{w}_m = -(t_m^{-1} \cdot t_1) \cdot \mathbf{v}_1 - \cdots - (t_m^{-1} \cdot t_{m-1}) \cdot \mathbf{v}_{m-1} + t_m^{-1} \cdot \mathbf{v}_m - (t_m^{-1} \cdot t_{m+1}) \cdot \mathbf{w}_{m+1} - \cdots - (t_m^{-1} \cdot t_n) \cdot \mathbf{w}_n$. Odtud potom vyplývá, že $\langle \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{m-1}, \mathbf{w}_m, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_{m+1}, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$, neboť zase generátory každého z těchto podprostorů leží i ve druhém podprostoru. Odtud a z výše uvedeného indukčního předpokladu nakonec plyne, že $\langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_{m+1}, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$. Opět tedy platí požadovaná rovnost.

Buď $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Řekneme, že konečná posloupnost $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ vektorů z $\mathbf{V}$ je **báze** vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$, jestliže

- vektory $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ jsou lineárně nezávislé a přitom
- vektory $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ generují celý prostor $\mathbf{V}$, což znamená, že $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n \rangle = \mathbf{V}$.

Poznamenejme ale, že odnikud neplyne, že by v daném vektorovém prostoru musela nějaká báze existovat, ani že by snad měla být jen jediná, pokud existuje.

Příklady. Nechť $(T, +, \cdot)$ je těleso. Viděli jsme, že pak kartézská mocnina $T^n = \{(s_1, s_2, \ldots, s_n) \mid s_1, s_2, \ldots, s_n \in T\}$ spolu s přirozeně definovanými operacemi sčítání $+$ a skalárního násobení $\cdot$ tvoří vektorový prostor $(T^n, +, \cdot)$ nad tělesem $(T, +, \cdot)$.

Pak vektory $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \ldots, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0, 0)$, $\ldots$, $\mathbf{e}_n = (0, 0, 0, \ldots, 0, 1)$ očividně tvoří bázi vektorového prostoru $(T^n, +, \cdot)$. Říkáme, že je to **kanonická báze** prostoru $(T^n, +, \cdot)$. Existuje ale mnoho jiných bází. Kupříkladu následující vektory $\mathbf{f}_1 = (1, 1, 1, \ldots, 1, 1), \mathbf{f}_2 = (0, 1, 1, \ldots, 1, 1), \mathbf{f}_3 = (0, 0, 1, \ldots, 1, 1)$, $\ldots$, $\mathbf{f}_n = (0, 0, 0, \ldots, 0, 1)$ tvoří rovněž bázi prostoru $(T^n, +, \cdot)$.

Buď opět $(T, +, \cdot)$ těleso. Viděli jsme také, že pak okruh polynomů $(T[x], +, \cdot)$ tvoří vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Tento vektorový prostor ale nemá žádnou bázi. Opravdu, pokud by nějaká báze tohoto prostoru existovala, byla by to konečná posloupnost polynomů $f_1, f_2, \ldots, f_m$ z $T[x]$, která by kromě jiného měla tu vlastnost, že by pomocí lineárních kombinací generovala celou množinu $T[x]$. Ve skutečnosti zde ale platí, že $\langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle \neq T[x]$. Stačí si totiž všimnout stupňů polynomů $f_1, f_2, \ldots, f_m$. Existuje jistě přirozené číslo n takové, že $\mathrm{st}(f_1) \leq n$, $\mathrm{st}(f_2) \leq n$, $\ldots$, $\mathrm{st}(f_m) \leq n$. To ale znamená že pak pro každý polynom g z $\langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$ platí $\mathrm{st}(g) \leq n$. Polynomy $f_1, f_2, \ldots, f_m$ tedy negenerují celou množinu $T[x]$.

Tvrzení. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Existuje-li konečná podmnožina $M \subseteq \mathbf{V}$ taková, že $\langle M \rangle = \mathbf{V}$, pak z každé podmnožiny $N \subseteq \mathbf{V}$ s vlastností, že $\langle N \rangle = \mathbf{V}$, lze vybrat nějakou bázi prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$.

Důkaz. Ukážeme nejprve, že pokud $\langle N \rangle = \mathbf{V}$, pak za daného předpokladu existuje konečná podmnožina $L \subseteq N$ taková, že $\langle L \rangle = \mathbf{V}$. Pro každý vektor $\mathbf{u} \in M$ ale máme $\mathbf{u} \in \langle N \rangle$, takže podle posledního tvrzení z minulé kapitoly existuje přirozené číslo n, vektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in N$ a prvky $t_1, \ldots, t_n \in T$ takové, že $\mathbf{u} = t_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \cdots + t_n \cdot \mathbf{v}_n$. Vyberme pro každý vektor $\mathbf{u} \in M$ takové vektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in N$ a sestavme ze všech těchto vybraných vektorů množinu L. Pak $L \subseteq N$ a L je konečná množina, neboť množina M je konečná. Navíc odtud plyne, že $M \subseteq \langle L \rangle$, takže $\langle M \rangle \subseteq \langle L \rangle$. Poněvadž $\langle M \rangle = \mathbf{V}$, znamená to, že $\langle L \rangle = \mathbf{V}$.

Ukážeme dále, že pro každou konečnou podmnožinu $L \subseteq \mathbf{V}$ splňující $\langle L \rangle = \mathbf{V}$ platí, že z ní lze vybrat bázi prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Poněvadž $\mathbf{V} \neq \{\mathbf{o}\}$, musí být $L \neq \emptyset$ a také $L \neq \{\mathbf{o}\}$. Vypišme vektory množiny L do posloupnosti $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_k$. Jsou-li tyto vektory lineárně nezávislé, pak již tvoří bázi prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Jsou-li naopak lineárně závislé, pak $k > 1$ a podle úvodního tvrzení této kapitoly existuje index $j \in \{1, 2, \ldots, k\}$ takový, že vektor $\mathbf{w}_j$ je lineární kombinací zbývajících vektorů této posloupnosti. To ale znamená, že $\mathbf{w}_j \in \langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{j-1}, \mathbf{w}_{j+1}, \ldots, \mathbf{w}_k \rangle$, takže máme $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_k \rangle = \langle \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{j-1}, \mathbf{w}_{j+1}, \ldots, \mathbf{w}_k \rangle$. Je tedy možné z množiny generátorů L vektor $\mathbf{w}_j$ vyškrtnout, aniž se změní podprostor, který tato množina generuje. Opakujeme-li tento postup několikrát, nakonec dostaneme vybranou podposloupnost vektorů, tedy podrobněji řečeno, zůstanou nám indexy $i_1, i_2, \ldots, i_\ell \in \{1, 2, \ldots, k\}$ splňující $i_1 < i_2 < \cdots < i_\ell$ takové, že bude platit $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_k \rangle = \langle \mathbf{w}_{i_1}, \mathbf{w}_{i_2}, \ldots, \mathbf{w}_{i_\ell} \rangle$ a přitom vektory $\mathbf{w}_{i_1}, \mathbf{w}_{i_2}, \ldots, \mathbf{w}_{i_\ell}$ budou již lineárně nezávislé. Budou tedy tyto vektory tvořit bázi vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$.

Věta. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Tvoří-li posloupnosti vektorů $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_m$ a $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n$ dvě báze vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$, pak platí rovnost $m = n$.

Důkaz. Podle definice pojmu báze vektorového prostoru jsou vektory $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_m$ lineárně nezávislé a přitom $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_m \in \langle \mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n \rangle$. Podle Steinitzovy věty o výměně tedy platí, že $m \leq n$. Podobně ale vektory $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n$ jsou lineárně nezávislé a přitom $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n \in \langle \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_m \rangle$. Takže opět podle Steinitzovy věty o výměně platí, že $n \leq m$. Celkem tedy $m = n$.

Ve tvrzení předcházejícím poslední větě jsme viděli, že každý nenulový vektorový prostor, který je generován nějakou konečnou množinou vektorů, má také nějakou bázi. V předchozí větě jsme dále viděli, že všechny báze takového prostoru mají stejný

počet vektorů. Můžeme tedy zavést následující pojem. Je-li $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$, který obsahuje konečnou podmnožinu $M \subseteq \mathbf{V}$ takovou, že $\langle M \rangle = \mathbf{V}$, a který tudíž má i nějakou bázi, pak počet n vektorů kterékoliv báze tohoto prostoru se nazývá **dimenze** vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. O prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ samotném pak říkáme, že je to vektorový prostor **konečné dimenze**. Mezi takové prostory řadíme i nulový vektorový prostor $(\{\mathbf{o}\}, +, \cdot)$, jehož dimenzi klademe rovnu 0.

Příklad. Buď $(T, +, \cdot)$ těleso a n přirozené číslo. Pak z předchozího příkladu plyne, že dimenze prostoru $(T^n, +, \cdot)$ je rovna n.

Tvrzení. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor konečné dimenze n nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m$ jsou lineárně nezávislé vektory z $\mathbf{V}$. Pak $m \leq n$ a existují vektory $\mathbf{w}_{m+1}, \ldots, \mathbf{w}_n \in \mathbf{V}$ takové, že posloupnost vektorů $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m$, $\mathbf{w}_{m+1}, \ldots, \mathbf{w}_n$ tvoří bázi vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$.

Důkaz. Nechť $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n$ je nějaká báze vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Pak $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m \in \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$. Podle Steinitzovy věty o výměně je tedy $m \leq n$ a při vhodném přečíslování vektorů $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n$ platí, že $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_{m+1}, \ldots, \mathbf{w}_n \rangle$. Podle předchozího tvrzení to ovšem znamená, že z vektorů $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_{m+1}, \ldots, \mathbf{w}_n$ lze vybrat bázi prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Poněvadž těchto vektorů je ale jenom n, podle předchozí věty musí tyto vektory samy už tvořit bázi vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$.

Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Řekneme, že vektory $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m$ z $\mathbf{V}$ tvoří **minimální množinu generátorů** prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$, jestliže tento prostor generují, tedy splňují $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m \rangle = \mathbf{V}$, avšak pro každou podmnožinu $M \subseteq \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m\}$, $M \neq \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m\}$ je již $\langle M \rangle \neq \mathbf{V}$. Dále řekneme, že vektory $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n$ z $\mathbf{V}$

tvoří **maximální lineárně nezávislou posloupnost vektorů** v prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$, jsou-li tyto vektory lineárně nezávislé, avšak pro kterýkoliv vektor $\mathbf{z} \in \mathbf{V}$ vektory $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n, \mathbf{z}$ jsou již lineárně závislé. Dodejme, že v této situaci musí ovšem vektor $\mathbf{z}$ být lineární kombinací vektorů $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n$. Takže pak vektory $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_n$ rovněž generují celý prostor $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Odtud a z předchozích výsledků potom plyne následující chrakterizace bází vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$.

Důsledek. Buď $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Pak pro libovolnou posloupnost $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ vektorů z $\mathbf{V}$ jsou následující tři podmínky ekvivalentní:

(i) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ tvoří minimální množinu generátorů prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$,

(ii) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ tvoří maximální lineárně nezávislou posloupnost vektorů v prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$,

(iii) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ je báze prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$.

Každý podprostor vektorového prostoru konečné dimenze je sám prostorem konečné dimenze:

Tvrzení. Buď $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ vektorový prostor konečné dimenze n nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Pak pro každý podprostor $\mathbf{W} \subseteq \mathbf{V}$ platí, že prostor $(\mathbf{W}, +, \cdot)$ sám je konečné dimenze, a je-li m jeho dimenze, pak $m \leq n$, přičemž $m = n$ právě tehdy, když $\mathbf{W} = \mathbf{V}$.

Důkaz. Je-li $\mathbf{W} = \{\mathbf{o}\}$, není co dokazovat. Předpokládejme tedy, že $\mathbf{W} \neq \{\mathbf{o}\}$. Podle předchozího tvrzení žádná posloupnost lineárně nezávislých vektorů z $\mathbf{W}$ nemůže mít více než n vektorů. Vyberme lineárně nezávislou posloupnost $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_m$ vektorů z $\mathbf{W}$ tak, aby jejich počet m byl nejvyšší možný. Pak ovšem $m \leq n$ a přitom $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_m$ zřejmě tvoří maximální lineárně nezávislou posloupnost vektorů v podprostoru $\mathbf{W}$, takže jde o bázi prostoru $(\mathbf{W}, +, \cdot)$. Má tedy tento prostor konečnou

dimenzi m. Přitom zmíněnou bázi lze doplnit dalšími vektory z $\mathbf{V}$ na bázi celého prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Je-li ovšem $m = n$, pak již $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_m$ musí být bází prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$, takže $\mathbf{W} = \mathbf{V}$.

Tvrzení. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor konečné dimenze nad tělesem $(T, +, \cdot)$ a nechť vektory $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ představují některou bázi tohoto prostoru. Pak pro každý vektor $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$ existují jednoznačně určené prvky $s_1, s_2, \ldots, s_n \in T$ takové, že $\mathbf{u} = s_1 \cdot \mathbf{f}_1 + s_2 \cdot \mathbf{f}_2 + \cdots + s_n \cdot \mathbf{f}_n$.

Poznámka. Prvky $s_1, s_2, \ldots, s_n$ se pak nazývají **souřadnice** vektoru $\mathbf{u}$ v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$.

Důkaz. Existence prvků $s_1, s_2, \ldots, s_n$ plyne z faktu, že vektory $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ generují prostor $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Jejich jednoznačnost plyne z lineární nezávislosti vektorů $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ následující úvahou. Nechť $t_1, t_2, \ldots, t_n \in T$ jsou obecně jakékoliv prvky takové, že $\mathbf{u} = t_1 \cdot \mathbf{f}_1 + t_2 \cdot \mathbf{f}_2 + \cdots + t_n \cdot \mathbf{f}_n$. Odečtením odtud dostáváme, že $\mathbf{o} = (s_1 - t_1) \cdot \mathbf{f}_1 + (s_2 - t_2) \cdot \mathbf{f}_2 + \cdots + (s_n - t_n) \cdot \mathbf{f}_n$. To znamená, že $s_1 - t_1 = 0$, $s_2 - t_2 = 0$, $\ldots$, $s_n - t_n = 0$, takže máme $s_1 = t_1$, $s_2 = t_2$, $\ldots$, $s_n = t_n$.

Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor konečné dimenze n nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť posloupnosti $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ a $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n$ tvoří dvě báze prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Nechť pro každé $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ jsou $a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{nj}$ souřadnice vektoru $\mathbf{g}_j$ v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$, takže $\mathbf{g}_j = a_{1j} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{2j} \cdot \mathbf{f}_2 + \cdots + a_{nj} \cdot \mathbf{f}_n$. Pak čtvercová matice $A = (a_{ij})_{i=1,\ldots,n,\, j=1,\ldots,n}$ nad $(T, +, \cdot)$ se nazývá **matice přechodu** od báze $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ k bázi $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n$.

Tvrzení. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ a $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n$ jsou dvě báze prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ a nechť A je matice přechodu od báze $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ k bázi $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n$. Nechť $\mathbf{u}$ je libovolný vektor z $\mathbf{V}$ a nechť $s_1, s_2, \ldots, s_n$, resp. $t_1, t_2, \ldots, t_n$ jsou souřadnice vektoru $\mathbf{u}$ v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$, resp. v bázi $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \ldots, \mathbf{g}_n$. Pak platí

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}.$$

Důkaz. Máme $\mathbf{u} = t_1{\cdot}\mathbf{g}_1 + t_2{\cdot}\mathbf{g}_2 + \cdots + t_n{\cdot}\mathbf{g}_n = t_1{\cdot}(a_{11}{\cdot}\mathbf{f}_1 + a_{21}{\cdot}\mathbf{f}_2 + \cdots + a_{n1}{\cdot}\mathbf{f}_n) + t_2{\cdot}(a_{12}{\cdot}\mathbf{f}_1 + a_{22}{\cdot}\mathbf{f}_2 + \cdots + a_{n2}{\cdot}\mathbf{f}_n) + \cdots + t_n{\cdot}(a_{1n}{\cdot}\mathbf{f}_1 + a_{2n}{\cdot}\mathbf{f}_2 + \cdots + a_{nn}{\cdot}\mathbf{f}_n) = (a_{11}{\cdot}t_1 + a_{12}{\cdot}t_2 + \cdots + a_{1n}{\cdot}t_n){\cdot}\mathbf{f}_1 + (a_{21}{\cdot}t_1 + a_{22}{\cdot}t_2 + \cdots + a_{2n}{\cdot}t_n){\cdot}\mathbf{f}_2 + \cdots + (a_{n1}{\cdot}t_1 + a_{n2}{\cdot}t_2 + \cdots + a_{nn}{\cdot}t_n){\cdot}\mathbf{f}_n$ a současně $\mathbf{u} = s_1{\cdot}\mathbf{f}_1 + s_2{\cdot}\mathbf{f}_2 + \cdots + s_n{\cdot}\mathbf{f}_n$. Vzhledem k jednoznačnosti souřadnic vektoru $\mathbf{u}$ v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ odtud a z definice násobení matic plyne dokazovaná rovnost.

Nechť ještě jednou $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor konečné dimenze n nad tělesem $(T, +, \cdot)$ a nechť $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ je některá jeho báze. Nechť $r \in T$ je libovolný prvek a nechť $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{V}$ jsou libovolné dva vektory. Nechť $s_1, s_2, \ldots, s_n$, resp. $t_1, t_2, \ldots, t_n$ jsou souřadnice vektoru $\mathbf{u}$, resp. $\mathbf{v}$ v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$. Pak

$$s_1 + t_1, s_2 + t_2, \ldots, s_n + t_n \text{ jsou souřadnice vektoru } \mathbf{u} + \mathbf{v} \text{ a}$$
$$r{\cdot}s_1, r{\cdot}s_2, \ldots, r{\cdot}s_n \text{ jsou souřadnice vektoru } r{\cdot}\mathbf{u},$$

obojí ovšem opět v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$. Z této skutečnosti je patrno, že zobrazení

$$\mathsf{C}_{\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\ldots,\mathbf{f}_n} : \mathbf{V} \longrightarrow T^n$$

přiřazující každému vektoru $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$ uspořádanou n-tici jeho souřadnic $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$ v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_n$ je bijekcí množiny vektorů $\mathbf{V}$ na kartézskou mocninu T^n, která přitom zachovává operace sčítání $+$ i vnějšího skalárního násobení $\cdot$ ve vektorových prostorech $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ a $(T^n, +, \cdot)$. V tomto smyslu je tedy zobrazení $\mathsf{C}_{\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\ldots,\mathbf{f}_n}$ izomorfismem vektorového prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ na vektorový prostor $(T^n, +, \cdot)$. Oba tyto prostory jsou nad tělesem $(T, +, \cdot)$ a je takto možno na ně hledět jako na dvě kopie jednoho a téhož vektorového prostoru. Přesně bude pojem izomorfismu dvou vektorových prostorů nad týmž tělesem zaveden později.