Obsah

Úvod

Na této stránce už nic jiného nebude.

Kapitola 2

Začínáme

2.2 Pokračujeme

Věta 2.1. *Moje první věta o tom, že* $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ *vypadá lépe, než* $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Věta 2.2 (Abelova). *Věta s označením.*

Lemma 2.3. *Všimněte si číslování.*

1 Definice. První definice.

Poznámka. První (nečíslovaná) poznámka.

Důkaz.

$$x^2 + y^2 = z^2 \qquad \heartsuit$$

Celý systém rovnic (2.1), skládající se z rovnic (2.1a), (2.1b) a (2.1c), se nachází na straně 3 v Kapitole 2.

$$\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \phantom{{}+ a_{34}x_4} &= y_1, && \text{(2.1a)}\\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \phantom{{}+ a_{13}x_3} + a_{24}x_4 &= y_2, && \text{(2.1b)}\\
a_{31}x_1 \phantom{{}+ a_{12}x_2} + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 &= y_3. && \text{(2.1c)}
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{3} + \dots} \tag{*}$$

Řetězové zlomky viz (*).

$$\left\langle u \,\middle|\, \sum_{i=1}^{n} F(e_i, v) e_i \right\rangle = F\left(\sum_{i=1}^{n} \langle e_i | u \rangle e_i, v \right) = F(u, v), \tag{2.2}$$