Obsah

Úvod

Na této stránce už nebude nic jiného, než několik krátkých položek výčtů (jako třeba položka 5).

1. jedna
2. dvě
3. tři
4. čtyři
5. pět
6. šest

Kapitola 2

Začínáme

2.2 Pokračujeme

Věta 2.1. *Moje první věta o tom, že* $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ *vypadá lépe, než* $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Věta 2.2 (Abelova). *Věta s označením.*

Lemma 2.3. $[0, 1]$ *je kompaktní podmnožinou* $\mathbb{R}$.
Všimněte si také číslování.

1 Definice. První definice.

Poznámka. První (nečíslovaná) poznámka.

Důkaz.

$$x^2 + y^2 = z^2 \qquad \heartsuit$$

Celý systém rovnic (2.1), skládající se z rovnic (2.1a), (2.1b) a (2.1c), se nachází na straně 3 v Kapitole 2.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \phantom{{}+ a_{24}x_4} &= y_1, && (2.1a)\\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \phantom{{}+ a_{13}x_3} + a_{24}x_4 &= y_2, && (2.1b)\\ a_{31}x_1 \phantom{{}+ a_{12}x_2} + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 &= y_3. && (2.1c) \end{aligned}$$

$$\cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cdots}} \tag{*}$$

Řetězové zlomky viz (*).

$$\left\langle u \,\middle|\, \sum_{i=1}^{n} F(e_i, v) e_i \right\rangle = F\left(\sum_{i=1}^{n} \langle e_i | u \rangle e_i, v \right). \tag{2.2}$$